

「TARC(Th2 ケモカイン)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

項目コード	検査項目	検査案内掲載頁
3189	TARC(Th2ケモカイン)	P.69

※変更内容については裏面をご確認ください。

変更期日

- 令和5年7月13日(木)受付日分より

●TARC(Th2 ケモカイン)

測定機器、測定試薬を変更いたします。

▼現法と新法の比較

変更内容	新	現
項目コード	3189	同左
検査項目名称	TARC(Th2ケモカイン)	同左
検査方法	CLEIA	同左
基準値(単位)	血清 小児(6~12ヵ月):1367 未満 (pg/mL) 小児(1~2歳):998 未満 (pg/mL) 小児(2歳以上):743 未満 (pg/mL) 成人:450 未満 (pg/mL)	同左
単位	pg/mL	同左
報告範囲	100未満、100~99990000 (pg/mL)	同左
報告桁数	有効4桁、整数8桁、小数0桁	同左
参考文献	測定法:山脇 一彦, 他:医療と検査機器・試薬44(5):428~433, 2021. 臨床意義:藤澤 隆夫, 他:日本小児アレルギー学会誌19(5):744~757, 2005.	測定法:安江 智美, 他:アレルギーの臨床34(10):60~65, 2014. 臨床意義:同左
備考	トロンビン入り採血管は測定値に影響を与える恐れがあるため使用を避けてください。	血漿はデータ低下が見られますので避けてください。トロンビン入り採血管は測定値に影響を与える恐れがあるため使用を避けてください。

エスアール検討データ

●相関図

TARC(Th2ケモカイン)

